Moderne Techniken und Effektivität der Ablation von Vorhofflimmern

Sven Reek, Aarau

No disclosures

Vorhofflimmerablationen Schweiz

CHPACE WEB, accessed Oct 2016

Klinischer Erfolg Ablation vs. medikamentöse Therapie

Wazni OM, 2005

Pappone C, 2006

Wilber D, 2010

Klinischer Erfolg Ablation als first-line Therapie

Cosedis Nielsen, 2012

Morillo CA, 2014

Klinischer Erfolg Paroxysmal vs. persistent vs. long-standing persistent AF

Type of AF	Success Without AADs				Success With AADs				Overall Success	
	No. of Cases	No. of Patients	No. of Patients	Rate Median (Interquartile Range)*	No. of Patients	Rate Median (Interquartile Range)*	No. of Patients	Rate Median (Interquartile Range)*	No. of Patients	Rate Median (Interquartile Range)*
Paroxysmal	85	9590	6590	74.9 (64.9-82.8)	1290	9.1 (0.2-14.7)	7870	84.0 (79.7-88.6)		
Persistent	73	4712	2900	64.8 (52.4-72.8)	595	10.0 (0.8-15.2)	3395	74.8 (66.1-80.8)		
Long-standing	40	1853	1108	63.1 (53.3-71.4)	162	7.9 (0.9-15.9)	1270	71.0 (67.4-76.3)		

*Median and interquartile range are calculated using center as unit of analysis.

Cappato, 2009

- PVI ist Grundpfeiler der Vorhofflimmerablation
- "...more extensive LA ablation may be needed..."
 - Lineare Ablationen
 - Komplexe fraktionierte male Elektrogramme
 - Ganglien
 - (Rotors)

p=0.15

59%

48%

44%

Haissaguerre, 1998

Vorhofflimmerablation = Pulmonalvenenisolation

Haissaguerre, 1998

Fire or Ice?

Kuck KH, 2016

Fire and Ice!

- Ziel der Katheterablation von Vorhofflimmern ist die Pulmonalvenenisolation
 - RF Ablation oder Cryoballoon
- ESC Guidelines 2016

Kuck, KH, 2016

Complete vs. incomplete PVI

Kuck, 2016

rhythmologie saargau

„Langzeit“- Ergebnisse

Komplikationen

Type of Complication	No. of Patients	Rate, %
Death	25	0.15
Tamponade	213	1.31
Pneumothorax	15	0.09
Hemothorax	4	0.02
Sepsis, abscesses, or endocarditis	2	0.01
Permanent diaphragmatic paralysis	28	0.17
Total femoral pseudoaneurysm	152	0.93
Total artero-venous fistulae	88	0.54
Valve damage/requiring surgery	11/7	0.07
Atrium-esophageal fistulae	6	0.04
Stroke	37	0.23
Transient ischemic attack	115	0.71
PV stenoses requiring intervention	48	0.29
Total	741	4.54

Cappato, 2010

rhythmologie saargau

Atrio-ösophageale Fistel

- Typisch: 7-30 Tage nach Intervention
- „Klassische“ Symptom-Trias
 - Fieber und Infektionszeichen ohne klaren Fokus
 - Retrosternale Schmerzen
 - TIA/Insult

Zusammenfassung

- Komplette PVI ist Grundlage der Katheterablation von Vorhofflimmern.
- RF Energie oder Cryoballon resultieren in vergleichbaren Ergebnissen.
- Katheterablation ist effektiver als Antiarrhythmika.
- Der klinische Erfolg für den individuellen Pat. ist schwer vorhersagbar.
 - Prediktoren: Alter, strukturelle Herzkrankheit, Arrhythmieanamnese, Typ des Vorhofflimmerns, ...
- Ablation sollte früh im Krankheitsverlauf evaluiert werden.
- Viele Patienten benötigen mehr als eine Intervention.
- Späte und sehr späte Rezidive sind möglich.
- **Nur OAK verbessert Prognose!**