Herzinsuffizienz- medikamentöse Therapie 2015

Update: Medikamentöse Therapien 26.11.15
D. Nobel, Kardiologie SRFT

Changes in Mortality by STEMI

50% der Patienten sterben in ersten 5 Jahren

Agenda

- Bedeutung
- was ist Herzinsuffizienz?
- Diagnose, Einteilung, Ursachen
- Fallbeispiele
- Pharmakotherapie

Meilensteine der Therapie I

Meilensteine der Therapie II

Prognostisch wirksame Therapie

Was ist Herzinsuffizienz?

- Ältere Definition:

Funktionsstörung des Herzens, bei welcher das Herz nicht mehr in der Lage ist, die Versorgung des Körpers erforderliche Pumpleistung zu erbringen

Neue Definition

Klinisches Syndrom, charakterisiert durch eine **gestörte Füllung** und/oder **verminderte Auswurfsleistung** des Herzens:

- **Typische Symptome** der Herzinsuffizienz:
Müdigkeit, Atemnot
- **Zeichen der Wassereinlagerung:**
Ödeme , Lungenstauung
- Objektivierbarer Nachweis einer **Funktionsstörung des Herzens**

Zahlen für die Schweiz

- **50% der Patienten sterben in ersten 5 Jahren** nach Diagnosestellung (vor 1990: 60-70%)
- drei Monate nach Spitalaufenthalt müssen 30-50% der Patienten wieder hospitalisiert werden
- jährliche Behandlungs-Kosten in CH: **650 Mio sFr**

Ursachen der Herzinsuffizienz

Herzinsuffizienz-Einteilung

- «systolische Herzinsuffizienz»
→ **HFrEF**
- «diastolische Herzinsuffizienz»
→ **HFpEF**

HFrEF

normal

HFpEF

Dilatiert	Grösse	Nicht dilatiert
Exzentrisch	Remodeling	Konzentrisch
↓↓↓	Pumpfunktion	Normal/↓
Variabel	Diastolische Funktion	↓↓↓

Spitalregion Fürstenland Toggenburg

Fallbeispiel: 85-jährige Patientin mit langjähriger Hypertonie

- Hospitalisation (IMC) wegen kardialer Dekompensation (**NT-pro-BNP 6870**) i.R. eines neu-diagnostizierten VHFLi, bei Eintritt tachykard und hyperten
- anamnestisch seit ½ Jahr Episoden mit Unwohlsein, Leistungsminderung, thorakalem Druck und Dyspnoe

Fallbeispiel: 85-jährige Patientin mit langjähriger Hypertonie

- Eintritt: ASS 100 mg, Coversum 10 mg, Bilol 7.5 mg, Torasem 10 mg, Ventolin, Axotide
- Therapie: Metoprolol i.v. zur Frequenzkontrolle, Torasem 20 mg, Bilol 5 mg, Coversum 10 mg, Nitroderm TTS 5, Clexane therapeutisch Beginn Marcoumar

IVSd	1.70 cm
LVIDd	3.89 cm
LVPWd	1.82 cm
IVSs	1.91 cm
LVIDs	2.64 cm
LVPWs	2.37 cm
EDV(Teich)	65.40 ml
ESV(Teich)	25.61 ml
EF(Teich)	60.85 %
%FS	32.03 %
SV(Teich)	39.79 ml
LVd Mass Index	226.27 g/m ²

MV E Vel	0.98 m/s
MV DecT	180.55 ms
MV Dec Slope	5.42 m/s ²
MV A Vel	0.41 m/s
MV E/A Ratio	2.40

56 HR

59 HR

60 HR

HFpEF

«diast. Herzinsuffizienz»

C10

59
HR

Unklare chronische Dyspnoe- häufigste Ursachen

bei älteren Patienten mit negativer initialer Evaluation (Anamnese, Untersuch, Lufu, Röntgen) besteht in ca. 2/3 Evidenz einer **diastolischen Dysfunktion**

Untersuchung	Kommentar	Klasse	Level
Transthorakale Echokardiografie	alle Patienten	I	C
12 Ableitung-EKG	alle Patienten	I	C
Blutchemie	alle Patienten	I	C
Hämatologie	alle Patienten	I	C
BNP, NT-proBNP, MR-proANP	alle Patienten	IIa	C
Thoraxröntgen	alle Patienten	IIa	C
Koronarangiografie	bei Hinweisen auf Ischämie	I	C
Kardiales MRI	ausgewählte	I	C

Figure 9 Event-Free Survival According to Multimarker Score Category

C. Machado
— M.D. —

Therapie-Prinzip

- Behandlung der Ursache
 - i. zB Klappenoperation, PTCA/Bypass-Chirurgie bei KHK
 - ii. zB Frequenz-Kontrolle bei tc VHFli
- Therapie des «final common pathway»
 - i. Medikamente
 - ii. Devices

Therapie-Ziele

- Linderung Symptome
- Verbesserung QoL
- Verbesserung der Prognose
- Verhinderung Hospitalisation aufgrund Herzinsuffizienz

Nicht pharmakologische Therapie

- Patienten-Selbstmanagement
 - i. Symptome erkennen
 - ii. tägliche Gewichtskontrollen (handeln bei +2 kg in 3 Tagen)
 - iii. Medikamentenkenntnis (Wirkung, NW)
 - iv. Therapie-Adhärenz
- Lifestyle (Nikotin-Stop, max. 1-2 Gläser Wein/d)

Nicht pharmakologische Therapie

- Diät
 - i. kein exzessiver Salzkonsum
 - ii. Trinkmenge < 2l nur bei schwer kontrollierbarer Hypervolämie und Hyponatriämie
- **Körperliche Bewegung** (30 min pro Tag)
- Impfung (Pneumovax, Influenza)

Vernetzte Patientenbetreuung

- Verminderung von Rehospitalisationen
- Verbesserung der Lebensqualität
- Verbesserung der Prognose
- Verminderung von Kosten verursacht durch Hospitalisationen

C. Machado
— M.D. —

Therapie	Kommentar	Klasse	Level
ACE-Hemmer	Alle Patienten mit HF und LVEF $\leq 40\%$	I	A
Betablocker	Alle Patienten mit HF und LVEF $\leq 40\%$	I	A
MR Antagonist	Alle Patienten mit HF und LVEF $\leq 35\%$ und NYHA II-IV trotz ACE-Hemmer und Betablocker	I	A
Ivabradine	Patienten mit LVEF $\leq 35\%$, Sinusrhythmus, Herzfrequenz 70/min, NYHA II-IV trotz ACE-I, Betablocker, MR Antagonist	IIA	B

Therapie	Kommentar	Klasse	Level
ARB	LVEF $\leq$ 40%, wenn ACE-I nicht toleriert	I	A
	LVEF $\leq$ 40%, ACE-I und Betablocker, aber MR Antagonist nicht toleriert	I	A
Digoxin	Sinusrhythmus, LVEF $\leq$ 45%, wenn Betablocker nicht toleriert	IIb	A
	Sinusrhythmus, LVEF $\leq$ 45%, NYHA II-IV trotz ACE-I, Betablocker und MR Antagonist	IIb	A

Recommendations	Class ^a	Level ^b	Ref ^c
Thiazolidinediones (glitazones) should not be used as they cause worsening HF and increase the risk of HF hospitalization.	III	A	131–133
Most CCBs (with the exception of amlodipine and felodipine) should not be used as they have a negative inotropic effect and can cause worsening HF.	III	B	134
NSAIDs and COX-2 inhibitors should be avoided if possible as they may cause sodium and water retention, worsening renal function and worsening HF.	III	B	135, 136
The addition of an ARB (or renin inhibitor) to the combination of an ACE inhibitor AND a mineralocorticoid antagonist is NOT recommended because of the risk of renal dysfunction and hyperkalaemia.	III	C	–

The NEW ENGLAND
JOURNAL *of* MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

SEPTEMBER 17, 2015

VOL. 373 NO. 12

Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure

Martin R. Cowie, M.D., Holger Woehrle, M.D., Karl Wegscheider, Ph.D., Christiane Angermann, M.D., Marie-Pia d'Ortho, M.D., Ph.D., Erland Erdmann, M.D., Patrick Levy, M.D., Ph.D., Anita K. Simonds, M.D., Virend K. Somers, M.D., Ph.D., Faiez Zannad, M.D., Ph.D., and Helmut Teschler, M.D.

..schädlich bei Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz NYHA II-IV mit einer EF <45%

Diuretika

- Linderung Symptome/Zeichen der Stauung
- vorzugsweise Schleifendiuretika (Torasemid, Furosemid)
- Problem: RAAS-Aktivierung, Volumendepletion, hohe Dosis eines Schleifendiuretikums = schlechte Prognose

ACE-Hemmer

- RRR 16%, ARR 4.5%, NNT 22 (41Mte)
- Verbesserung der LV-Funktion, der Symptome sowie des klinisches Zustandes
- für alle Patienten max. tolerierte Dosis
- Kontrolle Kreatinin/Kalium
- Dosis Schleifendiuretikum parallel minimieren
- ARB nur falls ACE-Hemmer nicht toleriert

ACE-Hemmer

- Wirkung: Nachlastsenkung, günstiges Remodeling
- Indikationen: EF<40% (mit oder ohne Symptome)
- Kontraindikationen:
 - i. Angioödem
 - ii. bilaterale Nierenarterienstenose
 - iii. Kalium >5 mmol/l
 - iv. Krea > 220 μ mol/L
 - v. schwere Aortenstenose

Betablocker

- ARR 4.3%, NNT 23 (1 Jahr)
- Verbesserung der LV-Funktion, der Symptome sowie des klinischen Zustandes
- für alle Patienten max. tolerierte Dosis
- was zählt?
 - i. Hf-Reduktion, grösster Effekt bei höchster Baseline-Hf
 - ii. aber: etwas Betablocker besser als kein Betablocker

Betablocker

- **start low- go slow- aim high**
- Kontraindikationen:
 - i. Asthma bronchiale (COPD ist keine Kontraindikation!)
 - ii. AV-Block 2. oder 3. Grades
 - iii. SSS
 - iv. HF<50/Min

The Use of Beta Adrenergic Blocking Agents in Heart Failure

Initial hemodynamic deterioration followed by reverse remodeling (decrease in EDV and ESV) with improved ventricular function over time (increased LVEF)

Aldosteron-Antagonisten

- Indikationen:
 - i. NYHA III – IV und EF <35%
optimale Betablocker- und ACE-Hemmer-
Therapie vorausgesetzt, 12.5 – 25 mg
täglich
 - i. früh nach Myokardinfarkt bei reduzierter
LVEF <40% und klinischen Zeichen einer
Herzinsuffizienz

Aldosteron-Antagonisten

- Kontraindikationen:
 - i. Kalium > 6.0 mmol/l, Dosisreduktion bei >5.5 mmol/l
 - ii. Kreatinin > 220 mcg/l
 - iii. nicht in Kombination ACEI und ARB oder zusätzlich zu kaliumsparenden Diuretika
- Mortalitäts- und Hospitalisationsreduktion sowie Verbesserung der NYHA-Klasse

Digoxin

- **tachykardes Vorhofflimmern** bei Herzinsuffizienz: Frequenzkontrolle
- **SR**: EF<40% bei NYHA II-IV, sofern ACE-Hemmer und Betablocker bereits auftitriert (**Ziel: 0.5-0.8 ng/ml, cave >1: Mortalitätszunahme**)
- Reduktion der Hospitalisationsrate und Verbesserung Symptome ohne Einfluss auf Mortalität

Fallbeispiel: 72-jähriger Landwirt

- notfallmässige Hospitalisation bei seit einigen Tagen zunehmender Dyspnoe, paroxysmaler nächtlicher Dyspnoe, Knöchelödemen und Gewichtszunahme von 9 kg, vom HA wurde vor 1 Monat ein VHFli diagnostiziert, Therapie: Xarelto, Cordarone, Bilol, Co-Lisinopril, Lasix

Fallbeispiel: 72-jähriger Patient

- 166 cm, 87 kg, BD 147/108 mmHg, Puls 136/min, AF 20/min, basale RG`s, Knöchelödeme bds.
- kvRF: arterielle Hypertonie, Nikotinabusus, Dyslipidämie

Labor	venös	Hb 165, MCH 30, MCV 88, Lc 10.3, Tc 307, Quick 40, INR 1.8, BSR 1, Glu 9.3, Na 140, K 4.5, Ca 2.2, Krea 90, Albumin 39, CRP < 10, ASAT 28, ALAT 34, GGT 159, AP 74, Cholesterin 4.8, HDL 0.88, TG 2.0, Troponin I < 0.01, NT-pro BNP 6190,
-------	-------	--

Fallbeispiel: 72-jähriger Patient

Fallbeispiel: 72-jähriger Patient

CTO

CTO

CTO

CTO

126 HR

130 HR

Fallbeispiel: Verlauf

- nach Ausschluss eines intrakardialen Thrombus (TEE) elektrische Kardioversion → Sinusrhythmus
- Therapie: Xarelto 20 mg, Digoxin 0.125 mg, Bilol 7.5 mg, Torasem 20 mg, Lisinopril 20 mg, Atorvastatin 40 mg

Fallbeispiel: Verlauf

- kavotrikuspidale Isthmusablation KSSG bei zusätzlichem Vorliegen eines Vorhofflatterns
- Holter EKG im Verlauf: durchgehend SR, mittlere Frequenz 79/min, kein VHFli-/Fluttern

2 Mte später

Tachykardiomyopathie

Reduktion des relativen
Mortalitätsrisikos
gegenüber Placebo

ACE-Hemmer*

16 %

(4,5 % ARR;
durchschnittliche
Nachsorge
41,4 Monate)
SOLVD^{1,2}

β -Blocker*

34 %

(5,5 % ARR;
durchschnittliche
Nachsorge
1,3 Jahre)
CIBIS-II³

MRA*

30 %

(11,0 % ARR;
durchschnittliche
Nachsorge 24
Monate)
RALES⁴

ARB*

17 %

(3,0 % ARR;
mediane
Nachsorge 33,7
MonatCHARM-
Alternative)
5

"Something's just not right—our air is clean, our water is pure, we all get plenty of exercise, everything we eat is organic and free-range, and yet nobody lives past thirty."

Heart failure: a state of "neurohumoral imbalance"

A paradigm shift: from "neurohumoral inhibition" to "neurohumoral modulation"

Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibition (ARNI): LCZ696

→ Entresto®

LCZ696

D Cardiovascular Death

No. at Risk

LCZ696	4187	4056	3891	3282	2478	1716	1005	280
Enalapril	4212	4051	3860	3231	2410	1726	994	279

C Hospitalization for Heart Failure

No. at Risk

LCZ696	4187	3922	3663	3018	2257	1544	896	249
Enalapril	4212	3883	3579	2922	2123	1488	853	236

HF-REF: The building blocks of therapy

ICD: Implantierbarer Cardioverter Defibrillator

CRT: kardiale Resynchronisationstherapie

Zusammenfassung 2015

- ACE-Hemmer/Betablocker als Standard, wobei ein grossflächiger Ersatz des ACE-Hemmers durch Entresto[®] (Valsartan/Sacubitril) zur Diskussion stehen wird (neue Guidelines: 2016)
- Schleifendiuretikum: so wenig wie möglich
- Aldosteron Antagonist: wenn NYHA II-IV trotz Standard-Therapie

Zusammenfassung 2015

- Ivabradin: Herzfrequenz >70 /min trotz Standardtherapie inkl. Betablocker (-Versuch)
- CRT-D für NYHA II/III (IV) trotz Standardtherapie bei LVEF $<35\%$ und LSB
- Optionen: Digoxin, Eisen
- Vernetzte, engmaschige Patientenbetreuung!

HABEN SIE AUCH SO
PROBLEME MIT SOLIDEN
ENTSCHEIDUNGEN ?!

JA UND NEIN...

- INTERNISTEN -

Spitalregion Fürstenland Toggenburg

B NYHA Functional Class

No. of Patients

FCM	304	287	294	294
Placebo	155	147	150	150

C 6-Minute-Walk Test

HF mit LVEF $\leq 40\%$ NYHA II)
 oder LVEF $\leq 45\%$ (NYHA III)
 UND
 Ferritin < 100 mcg/l
 oder 100-300 mcg/l +
 Transferrin-Sättigung $< 20\%$
 UND
 Hb 95-135 g/l

BNP; prognostische Bedeutung

BNP/NT-pro-BNP gesteuerte Therapie

Alter <75 Jahre

Alter >75 Jahre

At Risk for Heart Failure

Heart Failure

Figure 4. Classification of patients presenting with acutely decompensated heart failure. Adapted with permission from Nohria et al.⁷¹⁶

Hypertonie

- eine effiziente BD-Einstellung bei Hypertonikern reduziert die Inzidenz der Entwicklung einer Herzinsuffizienz um bis zu 50%
- der Nachweis einer linksventrikulären Hypertrophie im Ruhe-EKG ist assoziiert mit einem 14-fach erhöhten Risiko der Entwicklung einer Herzinsuffizienz bei Patienten <65 Jahren (cave: schlechte Sensitivität, TTE besser)

Asymptomatische LV-Dysfunktion (ALVD) Outcome

Table 2. Clinical Classifications of Heart Failure Severity.*

NYHA Functional Classification		ACC–AHA Stages of Heart Failure	
Class I	No limitation of physical activity; ordinary physical activity does not cause undue fatigue, palpitation, or dyspnea	Stage A	At high risk for heart failure; no identified structural or functional abnormality; no signs or symptoms
Class II	Slight limitation of physical activity; comfortable at rest, but ordinary physical activity results in fatigue, palpitation, or dyspnea	Stage B	Developed structural heart disease that is strongly associated with the development of heart failure but without signs or symptoms
Class III	Marked limitation of physical activity; comfortable at rest, but less than ordinary activity results in fatigue, palpitation, or dyspnea	Stage C	Symptomatic heart failure associated with underlying structural heart disease
Class IV	Unable to carry on any physical activity without discomfort; symptoms present at rest; if any physical activity is undertaken, discomfort is increased	Stage D	Advanced structural heart disease and marked symptoms of heart failure at rest despite maximal medical therapy

* The American College of Cardiology (ACC)–American Heart Association (AHA) classification is from Hunt et al.⁸ The New York Heart Association (NYHA) functional classification is from the Criteria Committee of the New York Heart Association.¹²

Fallbeispiel: 80-jährige Patientin

- Anstrengungsdyspnoe NYHA III/

Herzinsuffizienz?

- Anämie (Hb 88), chron. Niereninsuffizienz
K/DOQI III
- Herzinsuffizienz-Therapie: keine Besserung

Faktor

Einfluss auf BNP/NT-proBNP

LV Wandstress

↑

Myokardiale Ischämie

↑

✓ Alter

↑

✓ Weibliches Geschlecht

↑

✓ Nierenfunktion: eGFR ↓

↑

Body mass index ↑

↓

✓ Anämie: Hämoglobin ↓

↑

✓ Entzündung: Sepsis

↑

Vergleich: HFrEF versus HFpEF

	Herzinsuffizienz mit eingeschränkter Auswurfraction (HFrEF)	Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurfraction (HFpEF)
Häufigkeit	Häufig	Häufig
Alter	Jünger	Älter
Geschlecht	Häufiger Männer	Häufiger Frauen
Ätiologie	Häufiger ischämisch	Häufiger nicht-ischämisch
Vorhofflimmern	Seltener	Häufiger
LVEF	<50% (meist <<50%)	>50%
BNP/NT-proBNP	Höher	Tiefer
Symptomatik	Vergleichbar	Vergleichbar
Therapie	Gut definiert	Schlecht definiert
Prognose	Ernst	Ernst

Hinweise für Herzinsuffizienz

Parameter	Kommentar
Anamnese	
• Frühere Episode einer Herzinsuffizienz	Diagnose 6× wahrscheinlicher
• Paroxysmale nächtliche Dyspnoe	Diagnose 3× wahrscheinlicher
• <i>Fehlen</i> einer früheren Anamnese einer Herzinsuffizienz	Wahrscheinlichkeit der Diagnose auf die Hälfte reduziert
• <i>Fehlen</i> einer Anstrengungsdyspnoe	Wahrscheinlichkeit der Diagnose auf die Hälfte reduziert
Klinische Befunde	
• Dritter Herzton	Diagnose 11× wahrscheinlicher
• <i>Fehlen</i> von Rasselgeräuschen	Wahrscheinlichkeit der Diagnose auf die Hälfte reduziert
EKG	
• Vorhofflimmern	Diagnose 4× wahrscheinlicher
• <i>Fehlen</i> irgendeiner Abnormalität im EKG	Wahrscheinlichkeit der Diagnose auf 2/3 reduziert
Thorax	
• Pulmonalvenöse Stauung	Diagnose 12× wahrscheinlicher
• <i>Fehlen</i> einer Kardiomegalie	Wahrscheinlichkeit der Diagnose auf einen Drittel reduziert
BNP	
• Wert < 100 pg/ml	Wahrscheinlichkeit der Diagnose auf einen Zehntel reduziert

UNDERLYING CAUSES AND LONG-TERM SURVIVAL IN PATIENTS WITH INITIALLY UNEXPLAINED CARDIOMYOPATHY

Figure 1. Adjusted Kaplan–Meier Estimates of Survival According to the Underlying Cause of Cardiomyopathy. Only idiopathic cardiomyopathy and cardiomyopathy due to causes for which survival was significantly different from that in patients with idiopathic cardiomyopathy are shown.

Betablocker: Key Trials

Trial	Population	Betablocker	N	Mittlere Dosis	RRR
CIBIS-II ¹	LVEF<35%, NYHA III-IV	Bisoprolol vs. Placebo	2647	6.2 mg (1 Dosis)	Mortalität 34%
MERIT-HF ²	LVEF<40%, NYHA II-IV	Metoprolol <i>Succhinat</i> vs. Placebo	3951	159 mg (1 dosis)	Mortalität 34%
COPERNICUS ³	LVEF<25%	Carvedilol vs. Placebo	2289	37 mg (2 Dosen)	Mortalität 35%

¹CIBIS II Investigators and Committee. Lancet 1999;353:9-13

²MERIT investigators. Lancet 1999;353:2000-2007

³Packer M et al. N Engl J Med 1996;334:1349-1355

Kardiale Resynchronisation

NYHA II, III, ambulant IV	Klasse	Level
Chronische HF, LVEF $\leq 35\%$, QRS ≥ 150 ms, LSB, erwartetes Ueberleben >1 Jahr	I	A
LVEF $\leq 35\%$, QRS 120-150 ms, LSB,	I	B
LVEF $\leq 35\%$, QRS ≥ 150 ms, unabhängig von QRS-Morphologie,	Ila	B

Kardiale Resynchronisation

NYHA II, III, ambulant IV	Klasse	Level
LVEF $\leq$ 35%, QRS 120-150 ms, kein LSB, LVEF	IIb	B
QRS <120 ms	III	B

Prognostisch-wirksame Therapie «Room for improvement»

Medikamenten-Klasse	NNT*	Relative Risikoreduktion	Unbehandelte Patienten (mit Indikation)
ACE-Hemmer (ACEI)	77	20%	20%
β-Blocker	28	31%	14%
Aldosteron Antagonisten	18	25%	64%
ICD	70	26%	61%
CRT	24	29%	49%

* NNT: «Number needed to treat» um 1 Todesfall / Jahr zu verhindern

Normal

Systolic dysfunction

Diastolic dysfunction

BNP und NT-proBNP

- ***Quantitative*** Herzinsuffizienz-Marker
hilfreich bei:
 - i. Diagnose
 - ii. Risikostratifizierung
 - iii. Therapieoptimierung

Was ist BNP?

- B-type natriuretic peptide/ brain natriuretic peptide, 32 AA
- Wirkung
 - i. Diurese, Natriurese
 - ii. Vasodilatation
 - iii. Anti-Sympathicus und anti-RAAS

Fallbeispiel: 31-jährige Patientin

- Spontangeburt (4. Kind), isolierte SS-Hypertonie ab 34. SSW
- zwei Tage nach Geburt: Mühe mit Atmen (schon seit ca. 1 Mt, aktuell schlimmer), Palpitationen
- BD 121/92, P 130/min (SR), SO₂ 98%, internistisches Konsil → CT Frage nach LE
- CT: keine LE, Lungenödem und Pleuraergüsse, NT-pro-BNP 3930

Peripartum-Kardiomyopathie

EF 25%

22/04/2013-09:15:38

GLPS_LAX	-6.7 %	AVC_AUTO	325 msec
GLPS_MC	-6.0 %	HR_ApLAX	110 bpm
GLPS_A2C	-6.4 %	FR_min	65 fps
GLPS_Avg	-6.3 %

Fallbeispiel : 31-jährige Patientin

- Therapie mit Lisinopril 10 mg, Carvedilol 3.125 mg 2x, Torem 20 mg, Aldactone 25 mg, Xarelto 20 mg, Parlodel 2.5 mg 2x für 2 Wo, dann 1x für weitere 6 Wo
- Verlaufskontrolle nach 1 Mt: EF 38%, NT-pro-BNP 246
- Verlaufskontrolle nach 5 Mte.: EF 55%, NT-pro-BNP <60

5 Monate später

Peripartum-Kardiomyopathie

- Entwicklung einer Herzinsuffizienz im letzten SS-Monat oder innert 5 Monate nach Geburt
- keine andere identifizierbare Ursache einer Herzinsuffizienz
- keine bekannte Herzerkrankung vor dem letzten SS-Monat
- LV systolische Dysfunktion EF <45%